

# Reconnaître l'ambroisie

(*Ambrosia artemisiifolia*, Ragweed)



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD  
Bundesamt für Landwirtschaft BLW



**Inflorescences mâles**



**Inflorescences femelles**

*Les graines se forment au niveau des fleurs femelles, situées à l'aisselle des feuilles.*



**Tige**

*La tige est poilue.*

*Les plantes adultes peuvent, selon les lieux, mesurer de 30 à 150 cm. Lorsqu'elle a suffisamment d'espace, la plante se ramifie et peut former de nombreuses hampes florales.*

L'ambroisie est une nouvelle mauvaise herbe qui se propage, d'avril à septembre, sur les surfaces qui ne sont que partiellement recouvertes de végétation. Le pollen de l'ambroisie provoque des allergies chez de nombreuses personnes. Pour limiter son impact, il

convient de correctement reconnaître la plante et de l'éliminer. Dans les endroits propices, quelques plantes isolées peuvent engendrer en peu d'années de denses populations.



Des plantules peuvent germer de la mi-avril au début du mois de septembre. La période principale de germination s'étend de la mi-avril à la mi-juin; mais après un travail du sol, de nouvelles germinations peuvent avoir lieu jusqu'au début du mois de septembre.



Fin mai, les premières plantes atteignent 10–15 cm de hauteur



En juin, la plante forme des rameaux latéraux et pousse en hauteur

## Que faire si je trouve une plante d'ambroisie?

- Avertir l'autorité communale compétente. Leur donner, pour assurer la détermination, un échantillon de plante dans un sac en plastique transparent.
- Arracher la plante et la jeter aux ordures. Lors de fortes infestations, ou en cas de présence dans des parcelles agricoles, avertir la station phytosanitaire cantonale.
- Lorsque les plantes sont en fleurs, porter un masque à poussières et des gants lors de l'arrachage.



En juillet, les plantes les plus précoces commencent à fleurir; les inflorescences deviennent visibles.



La période principale de floraison s'étend d'août à septembre; mais les plantes les plus tardives peuvent fleurir jusqu'en octobre.



Les premières graines mûrissent au début du mois de septembre.

## Ne pas confondre l'ambroisie avec l'armoise

### Ambroisie

- Se développe tard et lentement (10–15 cm à fin mai)
- Fleurs vertes, principalement en août
- Les feuilles froissées (avec des gants!) sentent l'herbe
- Face inférieure des feuilles vertes

### Armoise

- Fin mai: 25–50 cm de hauteur
- Les fleurs s'ouvrent dès la fin juin
- Les feuilles froissées dégagent une odeur aromatique
- Face inférieure des feuilles blanchâtre

## A qui annoncer les foyers d'ambroisie?

Station phytosanitaire cantonale

BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS

## Impression

Auteurs: texte et concept Popow Agro Consulting, Lindau.

Première page: R. Gämperle, Strickhof, avec la collaboration, pour la mise en page et la recherche des illustrations de Denise Frei, Strickhof  
Illustrations: M. Hochstrasser und R. Gämperle, Strickhof.  
Ch. Bohren und N. Delabays, Agroscope ACW, Ch. Kuendig, PSD VD und M. Horner, PSD NE.

### Face supérieure de la feuille.



ambroisie

armoise

### Face inférieure de la feuille.



ambroisie

armoise